

Compressão Extrínseca em Cólon Sigmoide

Extrinsic Compression in Sigmoid Colon

CLOVIS DO VALLE

INSTITUIÇÃO: CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA - PARANÁ

COMENTÁRIOS

As imagens abaixo remetem a necessidade de atenção do endoscopista quando se depara com imagens sugestivas de lesões subepiteliais, nas quais a possibilidade de secção da mucosa para abordagem direta da lesão é aventada. O risco de perfuração, nesta situação, é elevado, razão pela qual devemos pensar na possibilidade de compressão extrínseca.

RELATO DE CASO

Paciente MHGV, 31 anos, sexo feminino, recebida para colonoscopia em janeiro de 2011, por apresentar dor abdominal. Ao exame observa-se lesão elevada compatível com nódulo submucoso com cerca de 2 cm de diâmetro. Ao toque com pinça, apresenta consistência firme e a mucosa que o recobre tem aspecto normal com sinal da tenda (imagem 1). Descrito no laudo: nódulo submucoso sugestivo de mioma da parede do sigmoide. Há indicação para ecoendoscopia. Paciente recebida para colonoscopia de acompanhamento do nódulo em janeiro de 2012. O exame mostrava-se normal (imagem 2). No intervalo entre os exames, a paciente foi submetida à histerectomia por apresentar útero miomatoso, inclusive com miomas subserosos fazendo proeminência extrauterina. A imagem que se viu no primeiro exame tratava-se de um destes miomas uterinos, fazendo compressão no cólon.

FOTO 1



FOTO 2



Endereço para correspondência: e-mail: eduardoghdemoura@gmail.com. **Recebido em:** 14/02/2012. **Aprovação em:** 01/03/2012.